

브루코

브루코가 설명해 주는 농약정보 5탄

농약을 올바르게 사용하는 방법



농약 올바른 사용법 첫번째

농약의 종류

"사용 용도에 따라 분류"



살균제, 살충제, 제초제, 생장조정제 등 분류

살균제 : 식물병원균 방제 약제

살충제 : 식물에 해를 주는 해충 방제 약제


제초제 : 식물의 생장을 어렵게 하는 잡초 방제 약제

생장조정제 : 식물의 생육조절에 사용되는 약제

농약 올바른 사용법 두번째

농약 포장지 읽는 방법

"같은 품목이라도 회사마다 상표명이 다를 수 있다"



상표명: 제품 브랜드명

품목명: 유효성분+제제가 같은 농약에 부여하는 이름

상표명이 달라도 품목명이 동일할 수 있으니, 구입시 반드시 확인!

농약 올바른 사용법 세번째

사용약량 및 살포물량 준수



◎ 적용병해충 및 사용량			물 200당 사용약량	안전사용기준	
작물명	적용병해	사용시기 및 방법		사용시기	사용횟수
감귤	재앙병	<ul style="list-style-type: none"> • 불철:새잎이 굵기 조금 (5월하순)부터 경엽처리 • 여름철:어름 손이 굵기 (7월상순)부터 경엽처리 	20g	수확 7일전까지 사용	4회 이내
	더듬이병	춘지발생 초 15일간격 경엽처리		수확 2일전까지 사용	5회 이내
고추 (추류포함)	탄저병	발병 초부터 10일간격 경엽처리	20g	수확 10일전까지 사용	3회 이내
고추	반점세균병	발병 초부터 7일간격 경엽처리		수확 14일전까지 사용	4회 이내
고추	노균병	발병 초부터 7일간격 경엽처리	40g	수확 7일전까지 사용	2회 이내
고추	무름병	발병직전부터 7일간격 경엽처리		수확 21일전까지 사용	2회 이내
감자	탄저병	발병 초 10일간격 경엽처리	20g	수확 14일전까지 사용	3회 이내
감자	견문잎마름병	발병 초 20일간격 경엽처리		낙화전까지 사용	3회 이내
마늘	검은잎마름병	발병 초 10일간격 경엽처리	—	—	—
마늘	낙조류	발병 초 10일간격 경엽처리	—	—	—
감자	흰녹가루병	발병 초 7일간격 경엽처리	—	—	—
양파	노균병	3월하순부터 낙화기까지 10일간격 경엽처리	—	—	—
참다래	재앙병	꽃이 피기 20일전부터 10일간격 경엽처리	—	—	—
참다래	꽃썩음병	꽃이 피기 20일전부터 10일간격 경엽처리	—	—	—

소량살포시, 약량이 적어 효과가 떨어지며
고농도로 살포시 부작용이 발생할 수 있음

적정한 사용량을 준수해야 방제효과 확실

농약올바른 사용법 네번째

농약의 저항성 예방

"약제별 작용기작 표시제도"

✓ 살균제

가, 나, 다 순

✓ 살충제

1, 2, 3 순

✓ 제초제

H1, H2, H3 순

약제 저항성 방지 방법

동일한 작용기작 약제 연속 사용 금지